

## **OBAVIJEST ZA BOLESNIKE (OPERACIJA LATERALNE CISTE VRATA)**

Poštovani pacijenti,

lateralna cista vrata je prirođena anomalija škržnih lukova. Manifestira se pojavom otekline na vratu, ukoliko se radi o cisti, ili pojavom sitnog otovra na koži vrata iz koje povremeno izlazi sluzava tekućina (fistula). Najčešće je bezbolna, ukoliko nije došlo do sekundarne upalne reakcije, to se manifestira crvenilom, bolnošću, povišenom tjelesnom temperaturom te gnojnom sekrecijom.

U postupku Vašeg liječenja planira se operacija lateralne ciste vrata. Kod većine bolesnika zahvat protekne bez ikakvih komplikacija uz blagu do umjerenu postoperativnu bolnost. Na našu Kliniku dolazite s kompletnom prijeoperacijskom obradom koju ste prethodno učinili ambulantno. Operativni zahvat će biti unutar nekoliko dana od prijema u bolnicu. Nakon operativnog zahvata zaostane manji ožiljak vratu. Planirani otpust iz bolnice je drugi do sedmi postoperativni dan, ovisno o tijeku oporavka i potencijalnim komplikacijama.

Od potencijalnih komplikacija mogu se javiti **otežan i slabije razumljiv govor, nemogućnost odizanja ramena i sindrom bolnog ramena, Hornerov sindrom, postoperativno krvarenje, infekcija rane te iznimno i druge komplikacije od kojih je najteža smrtni ishod.**

**OTEŽAN ILI SLABIJE RAZUMLJIV GOVOR** nastaje zbog ozljede živca hipoglosusa uslijed čega nastupa istostrana paraliza mišića jezika.

**NEMOGUĆNOST ODIZANJA RAMENA I SINDROM BOLNOG RAMENA** nastaje zbog ozljede živca akcesorijusa.

**HORNEROV SINDROM** je nastaje kao posljedica ozljede cervikalnog ganglija i manifestira se trijasom simptoma: spuštena gornja vjeđa oka, uska zjenica i uvučenom očnom jabučicom.

**POSTOPERATIVNO KRVARENJE** je komplikacija koja se većinom javlja u prvih 24 sata nakon operacije i rijetko je takvog stupnja da zahtjeva reviziju operativnog polja.

**INFEKCIJA RANE** se manifestira bolnošću, oteklinom i crvenilom kože oko operativne rane, ponekad uz gonju sekreciju.

