

OBAVIJEST ZA BOLESNIKE (OPERACIJA TREĆEG KRAJNIKA, ADENOIDA, VEGETACIJA) – ADENOTOMIJA

Poštovani pacijenti i roditelji,

Treći mandula (vegetacije, adenoidi) smještena je na stražnjoj stijenci nosnog ždrijela. Najčešći simptomi uvećane treće mandule su hrkanje, začepljenost nosa, iscjedak iz nosa, učestale upale uha, slabiji sluh, disanje na usta, dugotrajan kašalj.

U postupku liječenja planira se operacija treće mandule (adenotomija). Kod većine bolesnika zahvat protekne bez ikakvih komplikacija uz različitu od blage do umjerene postoperativne bolnosti.


Dijete se prima u bolnicu na dan planirane hospitalizacije. Kod prijema mora imati svu traženu prijeoperacijsku obradu te biti na tašte prema preporukama koje ćete dobiti uz ovu obavijest i narudžbu.

Otpust nakon operativnog zahvata se planira slijedeće jutro nakon pregleda liječnika.

Prilikom otpusta iz bolnice dobiti će te sve potrebne upute o prehrani, higijeni te režimu mirovanja u postoperativnom razdoblju.

U postoperativnom razdoblju se može javiti blaže povišena tjelesna temperatura, bolovi u ušima, bolovi prilikom gutanja. Tegobe prolaze na primjenu analgetika i antipiretika.

Od potencijalnih komplikacija mogu se **postoperativno krvarenje, infekcija promjene u glasu, te iznimno i druge komplikacije od kojih je najteža smrtni** Vrlo rijetko može doći do ozljede jezika, uvule ili zuba.



javiti
rane,

ishod.
nepca,

koja se

Postoperativno krvarenje je komplikacija može javiti od 1. do 21. dana nakon operativnog zahvata jer je potrebno tri tjedna da zacijele ranjave plohe operativnog polja (vrijeme kada padaju fibrinske naslage).

Infekcija rane manifestira se bolnošću, oteklinom i crvenilom sluznice oko operativne rane.

Promjene u glasu nastaju kao posljedica poremećaja funkcije mekog nepca i manifestiraju se kao hipernazalnost. Promjene su u pravilu prolazne i glas se većinom vraća u normalu kada nestane postoperativna bolnost.