


Poštovani pacijenti,

Dermatohalaza/ blefarohalaza se odnosi na višak i povećanu labavost kože vjeđa eventualno uz gubitak mišićnog tonusa i edeme vjeđa. Nastaje zbog gubitka elastičnog i vezivnog tkiva uslijed procesa starenja ili konstitucionalno uvjetovano, a rijede uslijed upale, traume, bolesti štitnjače ili kombinacija čimbenika. Dermatohalaza se može manifestirati smanjenim perifernim vidom, posebice u gornjem i/ili bočnom dijelu vidnog polja (tzv. funkcionalne), osjećajem težine, umora i bolnosti oko očiju. Mogu se javiti smetnje u centralnom dijelu vidnog polja zbog opuštenih kapaka ili trepavica koje zaklanjaju vid, upala kože (dermatitis). Također je i estetski problem jer licu daje umoran i tup izgled.



Korekcija kapaka (blefaroplastika) je individualan operacijski zahvat kojim se uklanja oslabjela koža i potkožje , glatki nabori, smanjuje natečenost i ispravljaju drugi znakovi starenja oko gornjih kapaka. Operativni zahvat traje od 45 min do 2h ovisno o tome hoće li se istodobno izvršiti i neki drugi zahvat.

U postupku Vašeg liječenja planira se funkcionalna blefaroplastika gornjih vjeđa. Na našu Kliniku dolazite s kompletnom prijeoperacijskom obradom (uključujući VP koje potvrđuje funkcionalni ispad u gornjoj polovici vidnog polja) koju ste prethodno učinili ambulantno. Operativni zahvat će biti na dan prijema u bolnicu, te se otpuštate kući isti dan, eventualno drugi dan nakon operativnog zahvata. Kod većine bolesnika zahvat protekne bez ikakvih komplikacija uz blagu do umjerenu postoperativnu bolnost.

Opis postupka:

Prvo se sterilnim flomasterom označi mjesto planirane incizije. Nakon primjene lokalnog anestetika učini se incizija na mjestu planiranog reza, kod gornjih vjeđa uobičajeno je u razini gornjeg sulkusa (tehnik sa skrivenim rezovima u prirodnim pregibima gornje vjeđe). Zatim se elektivno odstrani prolabirani dio masnih jastučića, te se termokauterizira mjesto defekta. Defekti se zašiju u slojevima. Ranu držite suhom do kontrole. Šavi se uklanjaju ambulantno 7-14 dana nakon operativnog zahvata.

Po potrebi može se započeti utrljavati gel/ mast protiv ožiljaka od 3. postoperativnog tjedna ovisno o ožiljnoj reakciji tkiva. Prvih nekoliko tjedana nakon zahvata rez bude crvenkast, a zatim blijedi.

Rezultati su vidljivi odmah nakon operacije, a otprilike za mjesec dana oči poprimaju konačni oblik i izgled. Rezultati blefaroplastike su relativno trajni. U nekih osoba traju cijeli život bez

potrebe za ponovnom korekcijom kapaka, a u nekih korekciju treba ponoviti nakon otprilike 7-10 godina.

Blefaroplastika je rutinska operacija oka, ali kao i kod svake operacije mogu nastati komplikacije. Češće se javljaju krvarenja u tkivo vjeđe, oteknuće vjeđe i periokularne regije, rijetko krvarenja periokularnog područja i u orbitalnu šupljinu infekcije, ozljede, zatvaranje ugruškom centralnih krvnih žila oka, kao i druge nuspojave lijekova. Navedene komplikacije liječe se konzervativno i/ili operativno i jako rijetko mogu dovesti do pogoršanja vida, gubitka vida ili samoga oka. Ozbiljne reakcije nepodnošljivosti glede životno važnih organa i njihovih funkcija (srce, krvotok, disanje, bubrezi) i trajna oštećenja (npr. Otkazivanje organa) vrlo su rijetke. Nakon lokalne anestezije zbog injekcija, rijetko mogu nastupiti problemi sa žvakanjem ili s podizanjem vjeđe operiranog oka.