

ZAVOD ZA MAKSILOFACIJALNU I ORALNU KIRURGIJU

KBC OSIJEK

BLEFAROPLASTIKA

Blefaroplastika je operativni kirurški za ispravljanje nedostataka ili deformacija vjeđa i za estetsku modifikaciju područja oka i lica. Uz izrezivanje i uklanjanje ili repozicioniranje (ili oboje) suvišnih tkiva, kao što je koža i masno tkivo, i ojačavanje odgovarajućih periokularnih mišića i tetiva. Postupak blefaroplastike rješava funkcionalne i kozmetske probleme periorbita, što je područje od obrve do gornjeg dijela obraza.

Blefaroplastika donjih vjeđa može uspješno riješiti anatomski pitanja viška kože vjeđa, mlitavosti očnih mišića i orbitalni septum, višak orbitalne masti, pogrešan položaj donjih vjeđa.

Kod gornjih vjeđa, postupak blefaroplastike može riješiti gubitak perifernog vida, uzrokovano opuštenošću kože gornje vjeđe koja se prebacuje preko trepavica. Zahvaćeni mogu biti vanjski i gornji dijelovi vidnog polja pacijenta koji stvaraju poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti poput vožnje automobila i čitanja knjige.

Ovakva operacija obično traje oko trideset do šezdeset minuta po oku i to u lokalnoj ili općoj anesteziji, a pacijenti obično bude hospitaliziran jedan dan poslije. Uklanjanja šavova je otprilike 5 do 7 dana nakon operacije

Postupak blefaroplastike obično se izvodi kroz vanjske kirurške rezove napravljene duž prirodnih linija kože (nabora) gornjih i donjih vjeđa. Kirurški rezovi se mogu napraviti i kroz spojnicu/konjunktivu tj. unutarnju površinu donje vjeđe, kao u slučaju transkonjunktivalne blefaroplastike.

Moguće komplikacije

- 1) Sindrom suhog oka - koji se može pogoršati poremećajem prirodnog, suznog (očnog) filma očiju
- 2) Labavost palpebralne kože (ektropion) - opuštenost ruba donje vjeđe
- 3) Naglašenost očne jabučice - izbočenje očne jabučice u odnosu na obraz