

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Ul. Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Tel: 031 511 511 (centrala)
Fax: 031 512 221
E-mail: ravnateljstvo@kbco.hr

ZAVOD ZA UROLOGIJU

Pročelnik Zavoda za urologiju
Oliver Pavlović, dr. med., spec. urolog
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Tel: ++385 (0)31 51 14 00
Fax: ++385 (0)31 51 22 24
E-mail: urologija@kbco.hr

INFORMACIJE ZA BOLESNIKE ZA OP. ZAHVAT HIDROCELE TESTISA

Opis postupka:

Hidrocela je nakupina tekućine oko testisa. Zahvat se provodi pod općom ili lokalnom anestezijom. Mali operativni rez se učini u području mošnjji. Testis sa tekućinom (hidrocelom) se oslobodi od ovojnice te se tada vadi kroz ranu. Otvara se prednja strana hidrocelne vreće te se ispusti zaostala tekućina. Pregleda se testis. Višak tkiva vreće (ako ga ima) se odstrani, a ostatak se zašije tako da se izokrene sa unutrašnje strane testisa da bi se spriječilo ponovno nakupljanje tekućine. Testis se vraća unutar mošnjje. Svako krvarenje se zaustavlja i rana se zatvara.

Prednosti:

Ovom operacijskom metodom može se u potpunosti odstraniti prekomjerna tekućina unutar ovojnice testisa, uraditi plastični zahvat ovojnice ili odstraniti ovojnicu testisa koja je izlučila prekomjernu tekućinu, a također intraoperativno se stječe uvid u izgled testisa i epididimisa.

Mogući rizici postupka:

Ovdje su navedeni uobičajeni rizici. Osim toga mogu postojati i neki neuobičajeni rjeđi rizici koji nisu ovdje navedeni. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom urologu. Ako je potrebna anestezija tijekom zahvata možete imati nuspojave zbog primijenjenih anestetika. Uobičajene nuspojave su osjećaj omamljenosti, mučnina, povraćanje, osip i opstipacija. Detaljnije informacije ćete dobiti od anesteziologa.

Specifični rizici:

- Ponekad je moguće da operacija bude popraćena bolovima, oteklinom, a povremeno i iscjetkom. Češće se to događa kada je hidrocela vrlo velika. Stanje obično postaje bolje za nekoliko dana ili tjedana, ovisno o veličini hidrocele.
- Rana se može inficirati, što je popraćeno crvenilom. U tom slučaju bi mogli biti potrebni antibiotici.
- Moguće je da bude svrbeža ili nelagode u predjelu rane koje može potrajati i do 6 mjeseci.
- Moguće je krvarenje unutar mošnjji nakon operacije, koje može stvoriti hematoma ili krvni ugrušak. Tijekom slijedećih tjedana će se hematoma povlačiti ili će, u slučaju da je hematoma velik, biti potrebna daljnja operacija.
- Moguća je pojava neosjetljivosti u području operativnog ožiljka tijekom nekog vremena; stanje bi se trebalo poboljšati za par mjeseci.
- Moguća je pojava određene nelagode ili zadebljanja oko operiranog testisa koje može ostati nakon operacije.

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa bolesnim srcem.

Zamjena za preporučenu operaciju hidrocele:

Može se uraditi punkcija hidrocele i evakuacija tekućine pod kontrolom UZV uređaja, no ovim postupkom se ne može odstraniti ovojnica testisa koja je uzrokom prekomjernog lučenja hidrocelne tekućine niti se može adekvatno vizualizirati izgled ovojnica, testisa i epididimisa.

Također postoji rizik od krvarenja ili nastanka infekcije.

Drugih alternativnih konzervativnih niti operativnih postupaka nema.