

Poštovani pacijenti,

Ječmenac (chalazion) je kronična upala Meibomovih žlijezda koja nastaje kao posljedica začepljenja odvodnog kanala žlijezde. Stvrdnuti i začepljeni sadržaj predstavlja prepreku daljem otjecanju loja pa se on skuplja iza začepljenog mjesta i formira masnu, tvrdnu tvorevinu u vidu male loptice, koja se ograniči kapsulom. Ukoliko se ječmenac ne povuče na konzervativnu terapiju (topli suhi oblozi, masaža, kapi i mast) mora se učiniti mala operacija kojom se odstrani masni sadržaj i kapsula koja ga je oblagala. U slučaju recidiva na istom mjestu treba kod operacije materijal poslati na patohistološku analizu, jer se veoma rijetko može patološki dijagnosticirati maligni tumor stanica lojnih žlijezda (adenocarcinoma sebaceum). Ječmenac se operira najčešće sa unutrašnje strane kapka, tako da ne ostane nikakav ožiljak.

Nakon pranja operativnog polja bolesniku se daje lokalna anestezija tankom iglicom, potom se postavi na vjeđu (mjesto na kojem se nalazi ječmenac) poseban instrument koji nam omogućava da se bez krvarenja u cijelosti odstrani sadržaj koji je začepio kanaliće kao i kapsula koja ga oblaže. Nakon toga skida se navedeni instrument, operater kratko pritisne mjesto na kojem je izvršen operativni zahvat kako bi zaustavio eventualno krvarenje, potom se ispere površina oka i stavi antibiotska mast i zavoj.

Za operativni zahvat kojim se uklanja ječmenac nisu potrebne nikakve predoperacijske pripreme; zahvat se obavlja u lokalnoj anesteziji, gotovo je bezbolan, oporavak je unutar jednog tjedna. Odmah nakon operacije možete normalno funkcionirati i nije vam potrebno bolovanje te se možete vratiti svim svakodnevnim obavezama- vožnji automobila, gledanju televizije, radu na računalu...

Kao i svi medicinski postupci i ovaj ima mogućnost komplikacija. Moguće je krvarenje iz mjesta reza, podljevi krvi (hematom), oteklina, ponovni nastanak chalaziona.

KRVARENJE IZ MJESTA REZA ta su krvarenja obično manja i osim pritiska za zaustavljanje ne zahtijevaju druge mjere liječenja

PODLJEV KRVI (HEMATOM), OTEKLINA može se javiti postoperativno u području uklonjenog ječmenca, najčešće nestaje unutar tjedan dana.

PONOVNI NASTANAK CHALAZIONA može biti uzrokovano nedostatnim odstranjivanjem sadržaja ili zbog sklonosti za razvoj chalaziona. Liječi se konzervativno ili operativno.