

Poštovani pacijenti,

Ksantelazme su nakupine lipida (masnoća) koje se nakupljaju pod kožom na gornjim i/ili donjim vjeđama. Najčešće se javljaju u unutrašnjem kutu oka i to učestalije na gornjim, nego na donjim vjeđama. Najčešće se javljaju među populacijom od 30 do 50 godina. Žučkaste tvorbe na kapcima bezopasne su, mekane na dodir, a povezuju se s visokim razinama kolesterola i triglicerida. Ne mogu spontano nestati, jedini način potpunog izlječenja je operacijski zahvat uklanjanja. Preporuča se ksantelazmu ukloniti dok je još mala, jer je tada i ožiljak diskretan, a mogućnost ponovne pojave smanjena.

Na našu Kliniku dolazite najprije na pregled kada se postavi indikacija za mali kirurški zahvat.



U postupku Vašeg liječenja planira se operativno uklanjanje ksantelazmi. Zahvat se obavlja u istom danu kada ste naručeni i istoga dana idete kući.

Opis postupka zahvata:

U područje vjeđe gdje se nalazi ksantelazma aplicira se lokalna anestezija. Nakon toga se kirurškim skalpelom i škalicama odstrani ksantelazma te se postave šavi. Šavi se uklanjaju na kontroli za 7 dana od operativnog zahvata. Nakon uklanjanja šavova ponekad je potrebno mazati područje reza antibiotskom masti nekoliko dana. Prvih nekoliko tjedana nakon zahvata rez bude crvenkast, a zatim blijedi, sve dok ne izbledi u cijelosti, tj ne nestane.

Uklanjanje ksantelazmi najčešće se vrši najviše iz estetskih razloga, no ponekad i iz funkcionalnih. Velike ksantelazme mogu dovesti do poremećaja pokretanja vjeđa prilikom čega može doći do spuštanja kapaka i samim time do ometanja vida.

Operacija uklanjanja ksantelazmi je rutinska operacija oka. Komplikacije su rijetke, kao npr. krvarenje u tkivo vjeđe i otok vjeđa i periokularne regije, rijetko infekcije, nuspojave lijekova (na lokalni anestetik, 2% Lidocain). Mogući su recidivi, tj ponovno pojavljivanje ksantelazmi.