

ZAVOD ZA MAKSILOFACIJALNU KIRURGIJU

KBC OSIJEK

OTOPLASTIKA (KOREKCIJA ODSTOJEĆIH UŠKI)

Otoplastika je plastično-rekonstruktivni kirurški zahvat kojim se korigira problem odstojećih uški.

Ova korektivna operacija može se izvoditi već poslije pete godine života. U najvećem broju slučajeva izvodi se kod djece starosti od 5.-14. godina ,ali se radi i kod starijih osoba.

Razlozi izvođenja otoplastike su slijedeći: odstojeće uške, deformacija hrskavičnog reljefa uške, duboke ušne školjke , hipertrofija ušnih resica ili kombinacija nekih od navedenih deformiteta.

Sama operacija radi semože izvoditi u općoj anesteziji (kod djece od 5.do 18.godine života) i u lokalnoj anesteziji (kod starijih osoba). Trajanje operativnog zahvata je oko 90 minuta za oba uha, u najvećem broju slučajeva.

Nakon operacije bolesnik ostaje hospitaliziran u bolnici u najvećem broju slučajeva oko 24 sata. Postoperativno vrši se imobilizacija ušne školjke elastičnim zavojem, u trajanju od 7 dana. Odstranjuju se drenaže prilikom otpusta sa bolničkog liječenja. Nakon 7 dana od operativnog zahvata odstranjuje se elastični zavoj te se preporuča nošenje elastične trake tijekom slijedećih 6 tjedana, a šavovi se uklanjuju nakon 14 dana od inicijalnog operativnog zahvata. Slijedećih 6 tjedana od operativnog zahvata preporuča se djeci pošteda od pohađanja tjelesnog odgoja te izbjegavanje kontaktnih sportova.

Rane komplikacije podrazumijevaju krvarenje, infekcija, kirurški uvjetovane deformacije, a od kasnih komplikacija su neprepoznato postoperativno krvarenje uz formaciju tzv. hrvačkog uha, deformitet tipa „telephone ear deformity“, upala hrsakvice.