

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**

Ul. Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek  
Tel: 031 511 511 (centrala)  
Fax: 031 512 221  
E-mail: ravnateljstvo@kbco.hr

**ZAVOD ZA UROLOGIJU**

Pročelnik Zavoda za urologiju  
Oliver Pavlović, dr. med., spec. urolog  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Tel: ++385 (0)31 51 14 00  
Fax: ++385 (0)31 51 22 24  
E-mail: urologija @kbco.hr

**INFORMACIJE ZA BOLESNIKE ZA OPERACIJU SKRAĆENOG FRENULUMA****Opis postupka:**

Produžavanje frenuluma je kiruški postupak kojim se produžuje skraćeni frenulum. Pod lokalnom, regionalnom ili općom anestezijom frenulum se presječe poprečno. Zašije se, poprečno na presjek, apsorptivnim koncem. Krvarenje se zaustavi.

**Prednosti:**

Kod spolno aktivnih mladića najčešće tijekom spolnog odnosa bez dovoljne lubrikacije dolazi do pucanja kože prepucija, nakon koje može doći do naizgled dramatičnog krvarenja. Ukoliko pacijent tada ne odlazi na pregled urologu, krvarenje može spontano na pritisak rukom prestati, no dolazi do pojave stvaranja ožiljka i frenulum koji možda i nije bio jako skraćen postaje apsolutno kraći. U tom slučaju postoji rizik za ponovim „pucanjem“ frenuluma, krvarenj i infekciji. Ovim kratkim i jednostavnim operativnim zahatom frenulum se plastičnim zahvatom rekonstruira, te se smanjuje stopa seksualne disfunkcije u muškaraca ali i spolnih partnerica, što je jedan od ciljeva ovog tretmana.

**Mogući rizici postupka:**

Mogući su rizici vezani uz anesteziju. Moguće su nuspojave vezane uz korištene lijekova. Obično lagana vrtoglavica, mučnina, kožni osip ili konstipacija.

**Specifični rizici:**

- Krvarenje iz rane može se nastaviti i nakon operacije zbog čega je rijetko potrebna nova operacija.
- Moguć je podljev ili oticanje penisa koji nakon nekoliko dana spontano nestane.
- Moguća je infekcija rane zbog čeg je ponekad potrebno uzimati antibiotike.
- Ukoliko se odstrani previše kože mogući su problemi s erekcijom.
- Moguće da vam se ne svidi kozmetski efekt.
- Iznimno rijetko, vanjski otvor mokraćne cijevi može biti nemamjerno ozlijeden tijekom operacije.
- Moguća je promjena u osjetu tijekom seksualnog odnosa.
- Svaka erekcija u postoperativnom razdoblju je bolna i ne preporučuje se te može uzrokovati pucanje šava. Ukoliko se to dogodi šavi će se morati ponovno postaviti.

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa bolesnim srcem.

**Zamjena za preporučeni postupak:** Ne postoji specifični alternativni konzervativni ili operativni zahvat, pogotovo kod kronično promjenjene kože.