

Poštovani pacijenti,

Transskleralna ciklofotokoagulacija (TSCPC) je zahvat kojim se smanjuje očni tlak.

Kako bi se smanjila / spriječila bolnost tijekom izvođenja postupka pacijentu se ordinira analgetska terapija (tablete , injekcija u debelo meso i pokraj oka te kapi u oko). Nakon što nastupi djelovanje analgetika / anestetika pristupa se zahvatu. Na oko se izvana višekratno primjenjuju laserski pečati kojima je cilj dugotrajnije ev. trajno smanjivanje stvaranja očne vodice čime se smanjuje očni tlak. Zahvat najčešće traje par minuta. Nakon zahvata pacijent nosi povoj na oku kroz 1 dan i potrebna je terapija dodatnim protuupalnim kapima kroz otprilike 1 mjesec. Oko najčešće boli još dan , dva nakon zahvata što se rješava tabletama protiv bolova.

Ponekad pacijenti unatoč primijenjenoj analgeziji ne mogu izdržati bolnost postupka te se pokaže potreba za jačom anestezijom (lokalna potencirana anestezija , opća anestezija). Najčešće se izvodi na teško slabovidnom ili slijepom oku kao palijativni zahvat u skrbi povišenog očnog tlaka tako da se ne može očekivati poboljšanje vida. Često se nakon određenog perioda vremena očni tlak iznova povisi te se zahvat mora ponoviti. Vrlo rijetke komplikacije su jača upala oka te sušenje očne jabučice.