


Poštovani pacijenti,

Glaukom je kronična bolest koja nastaje najčešće uslijed povišenog očnog tlaka koji dovodi do oštećenja vidnog živca i posljedičnog propadanja vidnog polja. Povišeni očni tlak nastaje uslijed neravnoteže između stvaranja očne vodice i njene odvodnje iz očne jabučice.

Liječenje glaukoma započinje se lokalnom medikamentoznom terapijom s ciljem postizanja vrijednosti očnog tlaka koje će spriječiti daljnje napredovanje bolesti. Ukoliko se ovim načinom liječenja ne može postići zadovoljavajuće sniženje očnog tlaka liječnik će vam preporučiti operativni zahvat kojim će se stvoriti alternativni put otjecanja očne vodice. Na našoj Klinici u tu svrhu izvodi se operativni zahvat trabekulektomije u lokalnoj anesteziji.



Prije planiranog zahvata potrebno je učiniti prije operacijsku obradu koja obuhvaća proširenu krvnu sliku s faktorima koagulacije i pregled vašeg obiteljskog liječnika koji će vam izdati potvrdu o sposobnosti za planirani operativni zahvat.

Operativni zahvata je obično isti dan kad i hospitalizacija. U slučaju da su vam jako visoke vrijednosti očnog tlaka uključit će vam se infuzija 20% manitola. Kod većine bolesnika zahvata protekne bez ikakvih komplikacija. Planirani otpust iz bolnice je treći dan nakon operacije.

Moguće komplikacije ovog operativnog zahvata su krvarenja, napredovanje katarakte, upale i odljepljenje žilnice.

Hemofthalmus ili krvarenje u unutrašnjost oka te hifema ili krvarenje u prednju očnu sobicu obično se javlja kod dijabetičara ili osoba na antikoagulantnoj terapiji i mogu biti uzrok trenutnog smanjenja vidne oštine. Posljedica je obično prolaznog karaktera i rijetko zahtjeva intervencije u smislu ispiranja prednje očne sobice ili operativnog odstranjenja krvi iz stražnjeg dijela oka.

Ukoliko dođe do napredovanja katarakte učinit će se operacija katarakte s ugradnjom intraokularne leće.

Upale -blebitis/ endoftalmitis karakterizirane simptomima poput crvenila, suzenja, promijene vidne oštine i javljaju se češće ukoliko su tijekom operacije korišteni antimetaboliti ( lijekovi koji sprječavaju ožiljavne i osiguravaju dulje preživljenje filtracijskog jastučića) zahtijevaju primjenu antibiotske terapije .

Nakon operacije glaukoma ,atkada, zbog naglog pada intraokularnog tlaka može doći do odljepljenja žilnice što zahtjeva češće kontrole a i moguća je potreba dodatnog operativnog zbrinjavanja.