

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Ul. Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Tel: 031 511 511 (centrala)
Fax: 031 512 221
E-mail: ravnateljstvo@kbco.hr

ZAVOD ZA UROLOGIJU

Pročelnik Zavoda za urologiju
Oliver Pavlović, dr. med., spec. urolog
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Tel: ++385 (0)31 51 14 00
Fax: ++385 (0)31 51 22 24
E-mail: urologija@kbco.hr

INFORMACIJE ZA BOLESNIKE ZA OP. ZAHVAT URETROTOMIJA

Postupka:

Uretrotomija je operacija kod koje se zareže tanka brazda u mokraćnoj cijevi (cijev kroz koju mokrite) kako bi se oslobodilo suženje (striktura) i poboljšao protok urina. U anesteziji, operater prolazi s posebnim urološkim endoskopskim instrumentom (tzv. uretrocistoskopom) duž mokraćne cijevi dok ne dođe do suženja. Umetne se maleni nož kroz uretrocistoskop i s njime se izreže ožiljno tkivo kako bi se otvorio isti promjer kao i u zdravome tkivu. U mokraćni mjehur se postavlja kateter na nekoliko dana (ili duže) kako bi se omogućilo zacjeljivanje bez ponovnog stvaranja ožiljka.

Prednosti:

Ovo je manje invazivna metoda liječenja suženja mokraćne cijevi jer nije potreban rez kože niti rez mokraćne cijevi izvana, već se sve rješava endoskopskim putem, bez većih komplikacija.

Mogući rizici postupka:

Ovdje su navedeni uobičajeni rizici. Osim toga mogu postojati i neki neuobičajeni rjeđi rizici koji nisu ovdje navedeni. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom urologu. Ako je potrebna anestezija tijekom zahvata možete imati nuspojave zbog primijenjenih anestetika. Uobičajene nuspojave su osjećaj omamljenosti, mučnina, povraćanje, osip i opstipacija. Detaljnije informacije ćete dobiti od anesteziologa.

Specifični rizici:

- Ožiljak se može ponovo pojaviti i operacija se možda bude trebala ponoviti.
- Mogu se razviti strikture i na drugim mjestima u mokraćnoj cijevi.
- Možda budu neophodni antibiotici dok tkivo bude zarastalo, ali unatoč tome postoji mogućnost da razvijem mokraćnu upalu unatoč svim poduzetim mjerama predostrožnosti.
- Može se pojaviti manja količina krvarenja kada se ukloni kateter. Ponekad ovo krvarenje može biti obilnije što može zahtijevati drugu operaciju.
- Rijetko se mogu pojaviti problemi s erekcijom penisa nakon operacije, ali je ovo uglavnom privremeno.

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa bolesnim srcem.

Zamjena za preporučenu operaciju:

Ovisno o stupnju i razini suženja eventualno u obzir dolazi bužiranje (proširenje) mokraćne cijevi posebnim instrumentima različite debljine, a također kod težih i opsežnih oblika suženja uretre u obzir dolazi otvoreni operativni zahvat mokraćne cijevi najčešće u dva akta s presađivanjem sluznice unutrašnjosti obraza kako bi se nadomjestio dio mokraćne cijevi koji je sužen, no detaljne informacije o ovoj vrsti zahvata potrebno je diskutirati s s nadležnim urologom koji je indicirao operativni zahvat.