

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

Ul. Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Tel: 031 511 511
Fax: 031 512 221
Email: ravnateljstvo@kbco.hr

SERKLAŽA VRATA MATERNICE

ŠTO JE SERKLAŽA VRATA MATERNICE

Serklaža vrata maternice je kirurški postupak koji se izvodi tijekom trudnoće u svrhu sprječavanja pobačaja i prijevremenog porođaja, a kojim se želi ograničiti skraćivanje i otvaranje vrata maternice. Zahvat uključuje postavljanje šava na unutrašnje ušće vrata maternice. Uspostava integriteta unutrašnjeg ušća vrata maternice može sriječiti prolaps vodenjaka, ascendentnu infekciju i prekinuti kontrakcije maternice.

Najčešće se izvodi u:

- trudnica s ponavljanim pobačajem u 2. tromjesečju trudnoće i/ili prijevremenim porođajem
- trudnica kod kojih je ultrazvučno procjenjena duljina vrata maternice < 25mm prije navršena 22 tjedna trudnoće
- trudnica s prohodnim cervikanim kanalnom između 16-22 tjedna trudnoće

ŠTO JE INSUFICIJENCIJA VRATA MATERNICE

Insuficijencija vrata maternice najčešći je uzrok kasnih pobačaja ili prijevremenog porođaja.

KAKO SE ZAHVAT IZVODI

Najčešća metoda postavljanja šava serklaže je po MacDonaldu i to između 16 i 22 tjedna trudnoće. U kratkotrajnoj općoj anesteziji nakon dezinfekcije rodnice prikaže se cerviks koji se prihvati hvataljkama i potom se postavi kružni submukozni šav na vrat maternice koji se čvrsto stegne.

KOJI SU RIZICI I MOGUĆE KOMPLIKACIJE OVOG ZAHVATA

Komplikacije serklaže vrata maternice uključuju infekciju, krvarenje nakon zahvata, prijevremeno prsnuće plodovih ovoja, prolaps plodovih ovoja, laceraciju cerviksa te pobačaj ili prijevremeni porođaj.