

KBC OSIJEK  
Ul. Josipa Huttlera 4, Osijek  
Tel: 031/ 511 511  
Fax: 031/ 512 221

Klinika za ginekologiju i opstetriciju  
Zavod za humanu reprodukciju i medinski potpomognutu oplodnju  
Voditelj Zavoda:  
prof. dr. sc. Siniša Šijanović , dr. med. specijalist ginekologije i  
opstetricije, subspec. humane reprodukcije

E-mail: ravnateljstvo@kbco.hr

## PREKID TRUDNOĆE

Nerođeni život zaštićuje ustav i kazneni zakonik.

Zakonski liječnik s dopuštanjem pacijentice, prekida trudnoću zbog slijedećih razloga.

### **Medicinska indikacija**

Prekid trudnoće je potreban ako postoji opasnost po život pacijentice ili se uklanja opasnost teškog pogoršavanja tjelesnog ili psihičkog stanja, a da se ta opasnost ne može ni na koji drugi način riješiti.

Liječnik koji prekida trudnoću mora imati nalaz drugog liječnika u pismenoj formi u kojem su objašnjene indikacije za prekid trudnoće.

### **Eugenička indikacija**

Trudnoću treba prekinuti kada embrio zbog loše nasljedne osnove ili zbog štetnih utjecaja , ima takva oštećenja zdravstvenog stanja da nastavljanje trudnoće nema smisla.

Liječnik koji prekida trudnoću mora imati i nalaz drugog liječnika u pismenoj formi u kojem su navedene indikacije za prekid trudnoće. Trudnoća se smije prekinuti do 22.tjednada od zadnje menstruacije.

### **Socijalna indikacija**

Liječnik može prekinuti trudnoću na zahtjev pacijentice iako ne postoje prethodno navedene indikacije, uz uvjet da nije prošlo više od 10 tjedana od zadnje menstruacije.

## LIJEČNIČKI SAVJETI PRIJE PREKIDA TRUDNOĆE

Prekid trudnoće uništava život nerođenog djeteta i zbog toga kod trudnice mogu nastupiti teška psihička stanja (npr. depresivno raspoloženje, osjećaj krivice, psihički uvjetovani seksualni poremećaji).

Niti jedan prekid trudnoće nije bez rizika.

Prekid trudnoće može dovesti do slijedećih komplikacija i posljedica.

### Tijekom zahvata:

- probijanje (perforaciju) maternice instrumentima što zahtijeva laparoskopiju ili otvaranje trbuha (laparotomija) te zbrinjavanje rane,a u ekstremnom slučaju i uklanjanje maternice
- jače krvarenje

### Rane komplikacije:

- povišena tjelesna temperatura s upalom maternice,jajnika i jajovoda
- krvarenje ako zaostane dio ploda što zahtijeva ponavljanje zahvata
- može se dogoditi da trudnoća ne bude uklonjena

### Kasne komplikacije:

- sterilitet zbog poslijeupalnih promjena na jajovodima
- učestali bolovi u zdjelici i ponavljajuće upale

- poremećaj menstrualnog krvarenja
- sklonost pobačajima i prijevremenim porođajima

Navedene komplikacije su rjeđe kod jednog prekida trudnoće dok su kod ponavljanih češće. Što je trudnoća veća, komplikacije su češće i ozbiljnije.

Medikamentozna sredstva koja se koriste za prekid uznapredovale trudnoće mogu dovesti do povraćanja, proljeva, pada krvnog tlaka, nesvjestice itd.

Također i neki prateći zahvati mogu dovesti do komplikacija (intravenozna injekcija, transfuzija krvi). Samo iznimno potrebna transfuzija krvi može dovesti do infekcije virusom hepatitisa B ili virusom HIV-a.

U interesu trudnice, a da bi istovremeno pokušao zaštititi život nerođenog djeteta liječnik mora ispitati da li trudnica istinski želi prekid trudnoće ili je na to izvana natjerana. Molimo da podijelite s nama sve potrebite podatke.

Nijedan liječnik nije obavezan prekidati trudnoću.

### **Postupak prekida trudnoće**

Postoji više metoda :

1. Operativni prekid kod svih trudnoća u prva tri mjeseca.

Operativni prekid je moguć u lokalnoj ili u općoj anesteziji.

U slučaju lokalne anestezije, nakon ginekološkog pregleda pacijentica dobiva intravensko sredstvo protiv bolova te sredstvo za opuštanje.

Liječnik postavlja instrumente u rodnicu, daje regionalnu analgeziju, nakon proširenja vrata maternice s jednim usisavajućim aparatom ili posebnim instrumentima uklanja sadržaj iz maternice.

Opća anestezija se primjenjuje po preporuci liječnika (operatera) ili na zahtjev pacijenta uz prethodnu obradu, ukoliko okolnosti to dopuštaju (hitnost zahvata), koja obuhvaća vađenje krvi i pregled anesteziologa.

2. Medikamentozni prekid kod patoloških trudnoća.

U razgovoru s liječnikom u ambulanti ćete dobiti sve mogućnosti u vezi izbora lijeka i potrebne doze medikamentnog prekida patološke trudnoće.

**OBAVEZNO SE JAVITE NA ULTRAZVUČNU KONTROLU 10 DANA NAKON NAKON ZAHVATA, A U SLUČAJU JAČEG KRVARENJA ILI POVIŠENE TEMPERATURE ZAHVATA I RANIJE.**

**MOLIMO VAS DA PRILIKOM PREGLEDA LIJEČNIKA PITATE O SVEMU ŠTO VAM SE ČINI VAŽNIM!**